

### Fuentes:

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)**, *Unsafe Abortion. Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2000*, 4ª Edición, Ginebra, 2004, [www.who.int/reproductive-health](http://www.who.int/reproductive-health).

**CENTRO PARA DERECHOS REPRODUCTIVOS (CRR)**, *Reflexiones sobre el aborto*, Briefing paper, New York, 2003, [www.reproductiverights.org](http://www.reproductiverights.org).

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOBRE DINÁMICA SOCIAL (CIDS)**, *El aborto inducido en Colombia: características demográficas y socio-culturales*, Universidad Externado de Colombia y OMS, Bogotá, 1992.

**ALLAN GUTTMACHER INSTITUTE (AGI)**, *Readings on Induced Abortion*, New York, 2000, [www.agi.org](http://www.agi.org).

**FAMILY CARE INTERNATIONAL (FCI)**, *Demorar el matrimonio y el primer nacimiento*, Grupo Inter Agencial para una Maternidad sin Riesgo, New York, 1998, [www.safemotherhood.org](http://www.safemotherhood.org).

**MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL**, *Plan de choque para la reducción de la mortalidad materna*, UNFPA y OPS, Bogotá, 2004, [www.minproteccionsocial.gov.co](http://www.minproteccionsocial.gov.co).

**PROFAMILIA**, *Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2000*, UNFPA, Bogotá, 2002, [www.profamilia.org.co](http://www.profamilia.org.co).

**IPAS**, *Asegurando el acceso de las mujeres al aborto seguro*, Chapel Hill, 2005, [www.ipas.org](http://www.ipas.org).

### En el mundo

- De los 210 millones de embarazos anuales, 80 millones son no planeados, es decir 2 de cada 5 embarazos. (OMS)
- De los embarazos no planeados, 46 millones (58%) terminan interrumpiéndose, 19 millones de estos en países donde la intervención voluntaria del embarazo es ilegal.
- En América Latina se practican 3 700.000 abortos inseguros. El riesgo de muerte a causa del aborto inseguro en los países en desarrollo es de 370 por cada 100.000 casos. (OMS)
- El número de mujeres que mueren a causa del aborto anualmente es 68.000, lo que equivale al 13% de la mortalidad materna. En América Latina, el aborto inseguro es responsable del 17 % de las muertes maternas. (OMS)
- Dos tercios de los abortos practicados al año corresponden a mujeres de 15 a 30 años. En América Latina más del 50% de los abortos se practican a mujeres de 20 a 29 años y casi el 70% a mujeres menores de 30 años. (OMS)
- El riesgo de morir durante el parto de las jóvenes de edades entre 15 y 19 años es dos veces mayor que el de las mujeres de 20 a 30 años. Este riesgo es cinco veces mayor en las menores de 15 años. En el mundo, la principal causa de muerte de adolescentes de 15 a 19 años son los embarazos tempranos, sus riesgos y complicaciones. (FCI) En los países en desarrollo 14% de los abortos se han practicado a menores de 20 años. (OMS)

## En Colombia

- Colombia, junto con Chile y El Salvador, son los únicos tres países de América Latina en los cuales la interrupción voluntaria del embarazo está prohibido bajo cualquier circunstancia. Sólo el 4% de la población mundial vive en países donde el aborto está absolutamente prohibido. (CRR).
- A pesar del gran descenso en la tasa global de fecundidad que ha logrado el país, del total de embarazos en Colombia, 24% termina en aborto y 26% en nacimientos no deseados, es decir que 50% de los embarazos no son deseados. (Profamilia)
- Entre todas las mujeres colombianas de 15 a 55 años, 22.9% -una de cada cuatro- declara haber tenido un aborto inducido. Dentro del grupo de mujeres de estas mismas edades que alguna vez han estado embarazadas, el porcentaje aumenta a 30.3% -una de cada tres-. Si se considera únicamente el grupo de adolescentes embarazadas menores de 19 años, el porcentaje llega a 44.5% -una de cada dos-. (CIDS).
- Dentro de las causas directas de mortalidad materna en Colombia la eclampsia es la principal, seguida en su orden por las complicaciones del trabajo de parto y el parto, el aborto y otras complicaciones del puerperio y hemorragias (Min. Protección Social). De estas causas el aborto es la única totalmente prevenible. (IPAS)
- Aunque el mayor porcentaje de las mujeres que han abortado pertenecen al estrato más bajo (27,2%), el aborto es practicado por mujeres todos los estratos socio-económicos. El 16,6% pertenecen al estrato alto, 24,1% al estrato medio-alto, 21,8% al estrato medio-medio, 21,6% al estrato medio-bajo, y 24,4% al estrato bajo. (CIDS)
- La mayoría de las mujeres que han abortado indican haber tenido sólo un aborto (79.2%). No obstante, una quinta parte de las mujeres que han interrumpido su embarazo de manera voluntaria (20,8%) han tenido dos o más abortos, 16,2% un segundo, 3,4% un tercer aborto y 1,2% cuatro o más abortos. (CIDS) En los países donde el aborto no está penalizado y se prestan servicios de salud reproductiva de calidad, la asesoría en materia de planificación familiar en el momento del primer aborto reduce sustancialmente el número de embarazos no deseados y la incidencia en terminaciones voluntarias de estos (AGI).

## Notas

Las adolescentes tienen un riesgo mayor de pre-eclampsia (presión arterial alta relacionada con el embarazo- y de parto obstruido ya que la cabeza del feto es más grande que su zona pélvica.